Tabla 2
Manifestaciones viscerales de arteritis de vasos grandes/medianos y vasculitis de vasos pequeños

I. Manifestación visceral de vaso grande/mediano	
Arteria carótida común	Mareos, dolor de cabeza, síncope
Arteria maxilar	claudicación mandibular
Arteria oftálmica	Pérdida visual, ceguera
Arteria subclavia	Entumecimiento y sensación de frío en las extremidades superiores, fácil fatigabilidad, diferencia en la presión arterial entre el brazo derecho e izquierdo, déficit de pulso
Arteria renal	Hipertensión, insuficiencia renal
Arteria mesentérica	Colitis isquémica (dolor abdominal, melena, etc.)
Arteria coronaria	Angina de pecho, infarto de miocardio
Arteria pulmonar	Tos, esputo sanguinolento, disnea
II. Manifestación visceral de arteritis de vasos de pequeño calibre	
Piel	Livedo reticularis, nódulos subcutáneos, púrpura, úlcera cutánea, necrosis en la punta de los dedos de las manos y los pies
Nervio periférico	Mononeuritis múltiple
Músculos	Mialgia
Articulaciones	Artralgia
Riñón	Glomerulonefritis necrotizante semilunar
Tracto gastrointestinal	Úlcera gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal
Corazón	Miocarditis, arritmia
Pulmón	Neumonitis intersticial, hemorragia alveolar pulmonar
Membrana serosa	Pericarditis, pleuritis
Ojo	Hemorragia retinal (pérdida visual), escleritis

Revisado de Ozaki et al. 3 .